

DOULEUR AIGUE D'ORIGINE TRAUMATIQUE CHEZ L'ADULTE

– Administration médicamenteuse, sur PM, par inhalation:

Méthoxyflurane - PENTHROX®

RECONNAISSANCE DE LA SITUATION :

4 Critères qui doivent **TOUS** être présents :

- Victime de **plus de 6 ans**
- **Consciente**
- Douleur **traumatique**
- Douleur **supérieure ou égale à 4** sur l'échelle de la douleur

LE MÉDICAMENT = Méthoxyflurane (PENTHROX®)

- Antidouleur non morphinique
- D'action **rapide** (6 min environ) et **prolongée** (25 min à 1h, en fonction de l'usage)
- Utilisée par voie **inhalée** à l'aide d'un dispositif d'inhalation

CONTRE INDICATION :

- Victime âgée de **moins de 6 ans**
- Douleur **non traumatique**
- **Détresse respiratoire**
- **Conscience altérée** (y compris prise de drogues, alcool, médicaments sédatifs...)
- **Effets indésirables graves connus** liés au médicament
- **Grossesse** (quel que soit le trimestre)
- Victime **dialysée**
- Utilisation récente de **2 flacons dans la même journée** ou **5 flacons dans la même semaine**

PRÉCAUTION D'UTILISATION :

- **Chambre de charbon actif correctement insérée** dans l'inhalateur
- **Expiration à travers l'embout buccal**
- Flacon correctement **rebouché** après utilisation
- Flacon + inhalateur remis dans **sachet plastique refermable** après utilisation

Ces 4 mesures préviennent d'une inhalation du gaz médicamenteux les personnes présentes sur les lieux

UTILISATION :

